

第五届 Xionger 网络数学竞赛试卷

(数学低年级组, 2022 年 9 月 10 日至 9 月 12 日)

考试时间: 2022 年 9 月 10 日上午 9 点至 9 月 12 日晚上 21 点
官方微信公众号: Xionger 的数学小屋

本试卷包含的题量较大, 祝福每位选手都能寻找到适合自己解答、乐在其中的试题。

每题暂不设分值, 希望诸位尽可能多地作答。试题解答请及时发送到邮箱 2609480070@qq.com, 逾期将取消参赛资格。要求解答字迹清楚, 排版美观, 推荐采用 PDF 文档格式提交, 文件命名: 数学低年级组 + 昵称 (或姓名) + 学校。

1. (1) 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数, 若 $\ln f(x)$ 是凸 (凹) 函数, 则称 f 是对数-凸 (对数-凹) 的, 证明: Gamma 函数 $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ 在 $(0, +\infty)$ 上是对数-凸的。

(2) 证明 Gautschi's 不等式

$$x^{1-s} < \frac{\Gamma(x+1)}{\Gamma(x+s)} < (x+1)^{1-s}, x > 0, 0 < s < 1.$$

- (3) 设 $\alpha > 0$, 研究级数 $\sum \frac{n!}{\prod_{k=1}^n (\alpha+k)}$ 的敛散性。

屋寒大学, BaireMath 供题

2. 设 f 为 \mathbb{R}^n 上的 C^2 映射. $Jf(x)$ 为 Jacobi 矩阵, 它的元素为 $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x)$, $i, j = 1, 2, \dots, n$. 在 Jacobi 行列式 $\det(Jf(x))$ 中对应的代数余子式为 $A_{ij}(x)$, $i, j = 1, 2, \dots, n$. 证明如下的 Hadamard 恒等式:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial A_{ij}}{\partial x_i}(x) = 0, j = 1, 2, \dots, n.$$

屋寒大学, BaireMath 供题

3. 设 f 在 $[0, 1]$ 上 n 阶连续可微, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0, f^{(i)}\left(\frac{1}{2}\right) = 0, i = 1, 2, \dots, n$. 证明

$$\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 \leq \frac{1}{(2n+1)4^n(n!)^2} \int_0^1 (f^{(n)}(x))^2 dx.$$

屋寒大学, BaireMath 供题

4. 求所有满足下述条件的实数 $a \in \mathbb{R}$: 存在可微函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ 使得

$$f'(x) = f(x + a), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

湖州师范学院, 阿渣 供题

5. 设 $(a_n)_{n \geq 1}$ 和 $(b_n)_{n \geq 1}$ 是正实数列, 且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{n} = a \in \mathbb{R}_{>0}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{nb_n} = b \in \mathbb{R}_{>0}.$$

计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{n+1\sqrt{b_{n+1}}} - \frac{a_n}{n\sqrt{b_n}} \right).$$

湖州师范学院, 阿渣 供题

6. 试证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^n |\sin(\pi x)|^x dx = \sqrt{\frac{8}{\pi}}.$$

家里蹲大学, Dylen 供题

7. Let n be any positive integer. Show that

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(n\theta - 2 \sin \theta) d\theta = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!(n+k)!}.$$

云南大学, Ulyanov Aleksandrov 供题

8. 定义一个 Fibonacci 数列, 满足 $F_1 = 1, F_2 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \forall n \geq 3$. 对每一个固定的 $k \geq 1, k \in \mathbb{N}^+$, 定义一个新的数列 $\left\{ \frac{F_{m_0+nk}}{F_{m_0+(n+1)k}} \right\}_{n=0}^{+\infty} (m_0 = 0, 1, \dots, k-1)$.

证明: 这个新的数列收敛, 并求出收敛的极限.

兰州大学, 按定义易证 供题

“

德国有 Springer, 我国有 Xionger

”



Xionger的数学小屋
长按识别二维码, 关注我的小屋

官方微信公众号: Xionger 的数学小屋